



ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

ЧЕМ ОПАСЕН ТУБЕРКУЛЕЗ?

Туберкулез – это хроническая бактериальная инфекция, которая занимает одно из первых мест в мире по показателям заболеваемости и смертности. Заражение происходит воздушно-капельным путем от больных, которые выделяют микобактерии туберкулеза с мокротой при разговоре, кашле, чихании.

Наиболее тяжелые формы туберкулеза возникают у новорожденных и детей раннего возраста.



КАКИЕ ВАКЦИНЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА?

Вакцинация против туберкулеза проводится с использованием вакцин БЦЖ и БЦЖ-М – для ослабленных новорожденных.

Вакцины против туберкулеза защищают от наиболее тяжелых, смертельных форм заболевания.

Вакцина не вызывает заболевание!

КОГДА ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА?

Вакцинация против туберкулеза проводится детям на 3-7 сутки после рождения в родильном доме. Если ребенок не был привит в родильном доме, то его вакцинируют в поликлинике по месту жительства после снятия противопоказаний. Перед проведением вакцинации вашего ребенка обязательно осмотрит врач.



КАК ПРОТЕКАЕТ ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА?

Через 4-6 недель после вакцинации в месте инъекции появляется пятно, потом инфильтрат (участок ткани, увеличенный в объеме и повышенной плотности) диаметром не более 10 мм. Затем образуется пузырек-гнойничок (его размер не превышает 10 мм) с прозрачным, а затем мутным содержимым, затем формируется корочка. Через 5-6 месяцев у большинства детей остается нежный поверхностный рубчик, наличие которого свидетельствует о сформировавшейся защите от туберкулеза.

Место введения вакцины нельзя обрабатывать йодом и другими дезинфицирующими растворами, а также накладывать повязку. Нельзя выдавливать содержимое пузырька. Если пузырек вскрылся, его не следует чем-либо отрабатывать – вскоре он подсохнет и превратится в корочку, которую нельзя удалять или подвергать трению, в том числе во время купания.

СПОСОБНА ЛИ ПРИВИВКА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Заражение возбудителем туберкулеза возможно и у привитых детей, но это происходит редко и заболевание протекает у них в легких формах.

